



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

2 หมู่ 12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร.035-440926-7

“ระวังจักจั่นอ้อยระบาด”

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ขณะนี้ได้พบการระบาดของจักจั่นอ้อย ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทองและสิงห์บุรี ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ



- ระยะไข่ ตัวเมียจะเจาะใบอ้อยตามช่องว่างเส้นกลางใบเป็นรูเล็กๆ เพื่อวางไข่ เมื่อไข่ฟักกลายเป็นตัวอ่อนจะร่วงลงสู่พื้นดิน โดยไข่ใช้เวลาฟักประมาณ ๔ เดือน
- ระยะตัวอ่อน อาศัยในดินที่ความลึกตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร ถึงมากกว่า ๒.๕ เมตร ดูดกินน้ำเลี้ยงจากรากพืช ทำให้รากพืชเหี่ยว และแห้งตาย ตัวอ่อนมีขาหน้าขนาดใหญ่สำหรับขุดดิน บางครั้งจะเห็นดินเป็นแท่งทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ เซนติเมตร บิดเป็นเกลียวโผล่ขึ้นมาจากดินสูงประมาณ ๕-๗ เซนติเมตร คล้ายกับดินที่เกิดจากไส้เดือนแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ ๔-๖ เดือน
- ตัวเต็มวัย เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่ จะไต่ขึ้นมาบนลำต้นเพื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยในเดือนเมษายน-กรกฎาคม

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แนะนำการป้องกันกำจัด ดังนี้

- **วิธีเขตกรรม**
 - การขุดหรือไถพรวน เพื่อจับตัวอ่อนในดิน เพื่อลดจำนวนจักจั่นอ้อย
- **วิธีกล**
 ๑. การจับตัวเต็มวัยนำมาประกอบอาหาร เพื่อลดจำนวนจักจั่นอ้อย
 ๒. การตัดใบอ้อยที่พบกลุ่มไข่จักจั่นในแปลงอ้อย นำมาเผาทำลาย

เกษตรกรหรือผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๔๔๐๙๒๖ ในวัน เวลาราชการทุกวัน