



ข่าวเดือนการะบาดศัตรูพืช

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

๒ หมู่ ๑๒ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ โทร.๐๓๕ - ๔๔๐๙๒๖

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

“ภัยร้ายที่ชาวสวนมะม่วงต้องระวัง”



นายสมคิด เฉลิมเกียรติ

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มะม่วงอยู่ในช่วงกำลังออกดอก สิ่งที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในขณะนี้ คือ “เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง”

เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง (Mango leaf hopper) พบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่ปลูกมะม่วง โดยพบได้ตลอดทั้งปี แต่ปริมาณประชากรของเพลี้ยจักจั่นจะเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงระยะออกดอก ตั้งแต่เมื่อ

มะม่วงเริ่มแทงช่อดอกจนถึงดอกตูม และมีปริมาณสูงสุดเมื่อดอกใกล้บาน และจะค่อยๆลดลงเมื่อมะม่วงเริ่มติดผล ซึ่งทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้าน ดอก และยอดอ่อน แต่ระยะที่ทำความเสียหายมากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอก โดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและช่อดอกทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยง จะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวๆ คล้ายน้ำหวานจับบนใบ ช่อดอก ผลและรอบๆทรงพุ่ม



ทำให้มะม่วงเหนียวเปียกเยิ้ม ต่อมาตามใบ ช่อดอก จะถูกปกคลุมกลายเป็นโรคเชื้อราดำ ถ้าปกคลุมมาก จะกระทบกระเทือนต่อการสังเคราะห์แสงส่วนใบที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงในระยะเพลสลาต จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบ ตามขอบใบจะมีอาการปลายใบแห้ง

การป้องกันกำจัด ศุนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนำดังนี้

๑. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจะช่วยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่น
๒. ทำความสะอาดแปลง เฝารมควันเพื่อไล่แมลง
๓. ในระยะที่ดอกมะม่วงกำลังบาน การพ่นน้ำเปล่าในตอนเช้าจะช่วยให้การติดมะม่วงดีขึ้น แต่ควรปรับหัวฉีดอย่าให้กระแตกดอกมะม่วงแรงเกินไป
๔. เมื่อเริ่มพบการทำลายของเพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง ให้ฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดา อัตรา ๘๐-๑๐๐ ซีซี ต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร ผสมสารจับใบ ประมาณ ๒-๓ ครั้ง ต่อเนื่องทุก ๕ วัน
๕. หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีแนะนำให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (เซฟวิน ๘๕% WP) อัตรา ๖๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด (imidacloprid) ๑๐ % เอสแอล อัตรา ๑๐ ซีซี ต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร (ที่มา:กรมวิชาการเกษตร) ในระยะก่อนมะม่วงออกดอก ๑ ครั้ง และเมื่อเริ่มแทงช่อดอก ๑ ครั้ง เมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร

นอกจากนี้ นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ โทร ๐๓๕-๔๔๐๙๒๖-๗ ทุกวันในวันเวลาราชการ

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๔๔๐๙๒๖ ในวัน เวลาราชการทุกวัน

ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพศรีจันทร์, วีระพงษ์ ฉ่ำมาก, วีระธรรม ชูใจ, มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง, ภควรินทร์ พัฒนมนัสศักดิ์, นภัสวรรณ กระจ่างกุล
บรรณาธิการ ชีระพงศ์ เล่าไฉ่ว

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

๒ หมู่ ๑๒ ต.พลับพลาไชยอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทร : ๐๓๕-๔๔๐๙๒๖ โทรสาร : ๐๓๕-๔๔๐๙๒๗

E Mail : pmc02@doae.go.th Website : www.pmc02.doae.go.th